SELY antoi kannanoton psykiatrian asemasta hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden tulevissa organisaatioissa on ollut esillä psykiatrian siirtäminen sosiaalitoimen alle, ja tätä kirjoittaessa päätös on jo tehty ainakin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. SELY pitää kiinni kannastaan, että psykiatria kuuluu kiinteästi erikoissairaanhoidon kokonaisuuteen.

Psykiatria on yksi suurimpia lääketieteen erikoisaloja, ja sen tulee olla lääketieteellisen johdon alainen.

Psykiatristen potilaiden suuri somaattinen sairastavuus edellyttää myös saumatonta yhteyttä muuhun erikoissairaanhoitoon. Päivystystyössä tämä on potilasturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Psykiatrian koulutus ja tutkimus sekä alan vetovoimaisuus erikoistumisalana on varmistettava.

Katso kannanotto https://www.sely.fi/wp-content/uploads/2022/01/Psykiatrian-asema-hyvinvointialueilla_-SELY-21-1-2022-1.pdf

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Lakiesitys on lausuntokierroksella. SELY painottaa lausunnossaan lääkärien vastuuta, potilasturvallisuutta ja mahdollisuutta riittävän laaja-alaiseen potilastietojen käyttöön niin, että hoito voidaan toteuttaa oikein, perusteltuja ja vakiintuneita toimintamalleja noudattaen. Myös lääkärin oikeusturva nostetaan esiin.

Kannanotto tuodaan SELYn kotisivuille maaliskuun aikana.

SELYn sessio Helsingin Lääkäripäivillä oli menestys

SELY järjesti yhdessä Lääkäriliiton Yksityislääkärit alaosaston kanssa session ”Yksityislääkäritoiminnan uudet tuulet”. Ohjelman aihepiirejä olivat osuuskunnat, yhteisyritykset, julkisomisteiset yhtiöt, työterveyshuollon ja digitaalisuuden näkökulma, etävastaanottotoiminta sekä ammatinharjoittajatoiminnan juridiikka.

Ohjelma nousi lääkäripäivillä suosituksi, livekatsojia oli 490 ja tallennekatsojia oli 89. Ohjelma tuodaan myös Pohjolan Lääkäripäiville vain pienin muutoksin 02.06.2022.

SELYn uudet kunniajäsenet

Kiitollisena merkittävästä toiminnasta Suomen lääkärikunnan hyväksi SELYn valtuuskunta kutsui uusiksi kunniajäseniksi sisätautien ja hematologian erikoislääkäri **Pekka Anttilan**, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri **Marjut Laurikka-Routin** sekä gastrokirurgian erikoislääkäri **Antti Tammisen**. Uudet kunniajäsenet ovat ajaneet erikoislääkärien asioita SELYn valtuuskunnassa ja hallituksessa joko puheenjohtajina tai/ja varapuheenjohtajina. Lisäksi he ovat SELYn mandaatilla toimineet aktiivisesti Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja hallituksessa sekä muissa liiton toimielimissä. Pekka Anttila valittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1986 Lääkäriliiton valtuuskuntaan. Lääkäriliiton hallituksessa hän oli usean kauden ja hallituksen puheenjohtajana 2004–2006. Marjut Laurikka-Routti on merkittävällä tavalla edistänyt etenkin yksityislääkärien edunvalvontaa Lääkäriliitossa aina vuodesta 2001 kun aloitti valtuuskunnassa. Antti Tammisen edunvalvontatyö alkoi jo 90-luvun lopulla Helsingin kaupungin lääkäriluottamusmiehenä. Valtuuskuntaan hänet valittiin vuonna 2001.

Kuvat Eero Antturi

Kunniajäsentilaisuuden yhteydessä vietettiin SELYn hallituksen vaihtokaronkkaa vuosien 2020 ja 2021 osalta. Kuvassa vasemmalta SELYn valtuuskunnan varapuheenjohtaja **Kia Pelto-Vasenius** 2018–2021, SELYn hallituksen jäsen **Antti Mali** 2018–2021, SELYn hallituksen puheenjohtajat **Kristiina Aalto** 2014–2020 ja **Niina Koivuviita** 2021 sekä nykyinen valtuuskunnan puheenjohtaja **Jukka Mattila**.

Amgevita 40 mg, liuos, esitäytetty ruisku tai kynä (SureClick®). Amgevita 20 mg, liuos, esitäytetty ruisku.

Vaikuttava aine: Adalimumabi. **Käyttöaiheet:** Nivelreuma, yhdistelmänä metotreksaatin kanssa: keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä , kuten metotreksaatilla, ei ole saatu riittävää vastetta; vaikean, aktiivisen ja progressiivisen nivelreuman hoitoon aikuisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet metotreksaattihoitoa. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Idiopaattinen juveniili polyartriitti: yhdessä metotreksaatin kanssa aktiivisen idiopaattisen juveniilin polyartriitin hoitoon yli 2-vuotiailla potilailla. Yksinään, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai metotreksaattihoidon jatkaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Entesiitteihin liittyvä artriitti: aktiivisen entesiitteihin liittyvän artriitin hoitoon 6-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Selkärankareuma: vaikean aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisilla, kun potilaan vaste tavanomaisille hoidoille on ollut riittämätön. Aksiaalinen spondylartriitti: vaikean aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta) hoitoon. Nivelpsoriaasi: aktiivisen ja progressiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisilla. Psoriaasi: keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuispotilailla, joille harkitaan systeemistä hoitoa. Läiskäpsoriaasi lapsilla: vaikean, kroonisen läiskäpsoriaasin hoitoon vähintään 4-vuotiailla lapsilla. HS-tauti: keskivaikean ja vaikean aktiivisen hidradenitis suppurativan (taiveaknen) hoitoon aikuispotilaille. Crohnin tauti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen Crohnin taudin hoitoon aikuisille. Crohnin tauti lapsilla: keskivaikean tai vaikean, aktiivisen Crohnin taudin hoitoon yli 6-vuotiailla. Ulseratiivinen koliitti: keskivaikean tai vaikean aktiivisen ulseratiivisen koliitin hoitoon aikuispotilaille. Uveiitti: ei-infektioperäisen intermediaarisen, posteriorisen ja panuveiitin hoitoon aikuispotilaille, joilla vaste kortikosteroideille on riittämätön, joiden kortikosteroidien käyttöä täytyy rajoittaa tai joille kortikosteroidihoito ei sovi. **Annostus ja antotapa:** Sairaudesta riippuen aloitusannos aikuisilla 40–160 mg adalimumabia, jonka jälkeen 40 mg viikon tai kahden viikon välein. Lapsilla aloitusannos 20–160 mg sairaudesta riippuen, jonka jälkeen 20 mg tai 40 mg kahden viikon välein painon mukaan. Pistetään ihon alle. Hoito tulee toteuttaa indikaation mukaiseen hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana ja valvonnassa. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aktiivinen tuberkuloosi tai jokin muu vakava infektio, kuten sepsis, sekä opportunistiset infektiot. Keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta (NYHA III/IV). **Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet:** Ennen Amgevita-hoidon aloittamista tulee kaikki potilaat tutkia aktiivisen tai inaktiivisen tuberkuloosin sekä HBV-infektion varalta. Potilaita tulee seurata huolellisesti infektioiden (mm. tuberkuloosin) varalta ennen Amgevita-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja sen jälkeen. Jos potilaalle kehittyy uusi, vakava infektio tai sepsis, hoito on keskeytettävä, kunnes infektio saadaan hallintaan. Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on keskus- tai ääreishermoston myeliinikatosairaus. Intermediaarisen uveiitin ja keskushermoston demyelinoivien sairauksien välillä on tunnettu yhteys. Lymfoomien, leukemian ja muiden maligniteettien kehittymisriskiä ei voida sulkea pois TNF-salpaajahoitoa saavilla potilailla. Lapsipotilailla suositellaan ajankohtaisten rokotussuositusten mukaisten rokotusten saamista ennen Amgevita-hoidon aloittamista. **Yhteisvaikutukset:** Vasta-ainemuodostus oli vähäisempää metotreksaatin kanssa annettuna kuin yksinään. Yhdistämistä anakinran tai abataseptin kanssa ei suositella. **Hedelmällisyys, raskaus ja imetys:** Riittävästä ehkäisystä huolehdittava Amgevitan käytön aikana ja vähintään 5 kk viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen. Amgevitan käyttöä raskausaikana ei suositella. Imettämisestä tulee pidättäytyä vähintään 5 kk viimeisen annoksen jälkeen. **Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn:** Amgevita voi vaikuttaa vähäisessä määrin. **Haittavaikutukset:** Hyvin yleiset ja yleiset: infektiot, pistoskohdan reaktiot, päänsärky, tuki- ja liikuntaelimistön kipu. Adalimumabihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia haittavaikutuksia, mm. kuolemaan johtaneita ja henkeä uhanneita infektioita ja eri syöpätauteja. Myös vakavia hematologisia, neurologisia ja autoimmuunireaktioita on ilmoitettu. **Pakkaukset ja hinnat (vmh sis.alv) 15.2.2022:** 20 mg: 1 esitäytetty ruisku: 181,70 € 40 mg: 2 esitäytettyä kynää: 589,66 €. 2 esitäytettyä ruiskua: 648,99 €. **Korvattavuus:** 20 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326). 40 mg: Erityiskorvattava (65 %) erillisselvityksen perusteella (281) tai peruskorvattava (40 %) erillisselvityksen perusteella (313, 319, 326, 380). **Säilytys:** Jääkaapissa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle. **Reseptilääke. Lisätiedot:** Valmisteyhteenveto.